

兵庫県水産技術センターだより

貝毒情報(マガキ) KD-30-16号

平成30年5月16日発行

プランクトン及び貝毒検査を5月14日～5月16日に実施しましたので、その結果をお知らせします。

【概況】・貝毒検査(5/16)の結果、播磨灘(姫路・たつの・相生・赤穂)で採取したマガキから麻痺性貝毒は検出されませんでした。

・貝毒原因プランクトンは、わずかに見られる程度でした。


【検査結果】



年月日(採水・採取)		H30.5.16	H30.5.16	H30.5.16	H30.5.16
地点(St.)		姫路	たつの	相生	赤穂
水温(°C)		18.2	18.1	18.1	18.3
塩分		21.9	27.8	29.8	30.5
貝類の毒化状況 〔マウスユニット/g〕	麻痺性貝毒	ND	ND	ND	ND
麻痺性貝毒 原因プラン クton	アレキサンドリウム タマレンセ <i>Alexandrium tamarense</i> (個数/ℓ)	0	0	0	0
	アレキサンドリウム <i>Alexandrium sp.</i> (個数/ℓ)	0	0	0	20
下痢性貝毒 原因プラン クton	ディノフィシス フォルティ <i>Dinophysis fortii</i> (個数/ℓ)	0	0	0	0
	ディノフィシス アキュミナータ <i>Dinophysis acuminata</i> (個数/ℓ)	0	20	0	0

※NDとは、検出限界以下のことです。

※下痢性貝毒の検査は、兵庫県及び近隣府県の貝毒及びプランクトンの発生状況を考慮し必要に応じて適宜実施します。



<規制の基準>

可食部の毒量が

麻痺性貝毒:4マウスユニット/g

下痢性貝毒:0.16mg オカダ酸当量/kg } を超えた場合

<注意が必要なプランクトン密度>

・麻痺性貝毒原因プランクトン(代表的な種)

アレキサンドリウム タマレンセ
Alexandrium tamarense 5,000 個数/ℓ以上

アレキサンドリウム カテナラ
Alexandrium catenella 50,000 個数/ℓ以上

・下痢性貝毒原因プランクトン(代表的な種)

ディノフィシス フォルティ
Dinophysis fortii 50,000 個数/ℓ以上

【今後の情報予定】

- ・今漁期のマガキの調査は今回で終了です。5月21日の週にアサリ(大阪湾・紀伊水道)、トリガイ・アカガイ(播磨灘)の調査を予定しています。調査結果がまとまり次第「貝毒情報」としてお知らせします。

§お問い合わせ先§ 兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術センター(担当:水産環境部 都倉・宮原)

Tel : 078-941-8602

Fax : 078-941-8604

Homepage : <http://www.hyogo-suigi.jp/>

【参考】

貝毒とは？

ホタテガイ、カキ、アサリ等の二枚貝が有毒プランクトンを食べることで毒化し、毒化した貝を人間が食べることで食中毒を起こすことがあります。貝毒には、症状により麻痺性貝毒、下痢性貝毒などがあります。

貝毒の原因

二枚貝は海水中のプランクトンなどを餌としています。一部の毒をもつプランクトンを摂取することによって、貝自体が毒素を中腸線（肝すい臓）に蓄積することにより起こるとされています。よって、プランクトンがいなくなれば、毒は貝から排泄されます。

毒化する貝の種類

アサリ、カキ、ムラサキイガイ、バカガイなどの二枚貝類のみ

毒の持続期間

毒化した貝を、原因プランクトンが発生していない海域に移動すると2週間程度で無毒になる例がありますが、地域、条件によって異なるようです。

毒化した貝の出荷規制

食品衛生法第6条に有害食品等の販売等の禁止が規定されており、罰則もあります。

その可食部の毒量が、麻痺性貝毒は4MU(=マウスユニット)/g、下痢性貝毒は0.16mgOA(=オカダ酸)当量/kg を超えるものの販売等を禁止しています。この規制値を超えた場合に出荷自主規制処置を取り、県民の皆様に情報提供を行います。

貝毒量が一定期間連続して規制値未満であった場合、出荷自主規制処置を解除し、注意体制をとります。



貝毒原因プランクトンの一種

アレキサンドリウム タマレンセ
Alexandrium tamarense

(大きさ1mmの1/30)

